

DODATKOWE INFORMACJE



Państwowa Agencja Atomistyki i Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej prowadzą stały monitoring poziomu promieniowania w atmosferze. Wyniki monitoringu oraz komunikaty dostępne są na stronie internetowej www.gov.pl/web/pao

Więcej o zaleceniach i przeciwwskazaniach stosowania jodku potasu

rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl

JEŚLI WYSTĄPIĄ JAKIEKOLWIEK OBJAWY NIEPOŻADANE ORAZ W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK WĄTŁIWOŚCI, SKONTAKTUJ SIĘ Z LEKARZEM LUB FARMACEUTĄ!



Ministerstwo Zdrowia
Biuro Rozprawy Podatkowej
UZDROWIE

Ministerstwo Zdrowia
UZDROWIE



Ministerstwo Zdrowia
Biuro Rozprawy Podatkowej
UZDROWIE

Wskazówki dotyczące przyjmowania tabletek ze stabilnym jodem

Aby uzyskać odpowiednią dawkę dla niemowląt i małych dzieci, należy przełamać tabletkę wzdłuż linii podziału i podać dziecku wskazaną część tabletki.



Tabletki można rozgryzać lub polićkać w całości. Dla dzieci karmionych piersią można rozkruszyć tabletki i rozpuścić je w wodzie, syropie lub innym płynie.

Kiedy nie przyjmować leku?

- jeśli masz uczulenie na jodek potasu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
- jeśli masz nadczynność tarczycy
- jeśli masz zaburzenie naczyń krwionośnych (zapalenie naczyń z hipokomplementemią)
- jeśli masz choroby autoimmunologiczne połączone ze świadem i pęcherzami na skórze (opryszczkowe zapalenie skóry Duhringa)

PROFILAKTYKA JODOWA

BROSZURA INFORMACYJNA

W przypadku użycia elektronowej zgłosowej i uzupełnienia do elektronicznie radiologicznego poda koniecznie jest podanie nazwiska, przypisującego mu logotypu lekarza, tabelek zawierającej wynik stwierdzenia stabilnego jodu.

Przyjęcie tabletek masyca tarczycy stabilnym jodem blokuje wchłanianie przez nią radioaktywnego jodu i zapobiegając jego gromadzeniu.

Aby zapewnić odpowiednią ochronę, lek należy przyjąć dousznie, niezwłocznie po objęciu komunikatu od właściwych służb o wystąpieniu zagrożenia radioaktywnego (najlepiej w ciągu 2 godzin). Przyjęcie tabletek w ciągu 8 godzin od ekspozycji nie daje lepszego rezultatu niż podanie kocystyny.

Dawkowanie tabletek ze stabilnym jodem zależy od wieku.

Stosowanie dawek większej lub mniejszej od zalecionej może zagrozić zdrowiu.

- dzieci do 6 m.: 1 tabletkę po dawkę 12 mg; 2 tabletki dla odpowiednio 308 mg jodku
- dzieci od 3 do 12 m.: 1 tabletkę 50 mg jodu
- dzieci od 1 miesiąca do 3 r.: 1/2 do 1 tabletki 121 mg jodku
- noworodki: ½ tabletki (12,5 mg jodu)
- tabletki należy i hamująco przejąć 2 tabletki (100 mg jodu)



OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

UWAŻAJ, JEŚLI:

- storszeń lub stłoszeń w przebiegu leczenia chorób tarczycy
- występuje w Ciebie nielekczona avitaminoza tarczycy
- występuje w Ciebie zaburzenie czynności nerek
- masz zaburzenie czynności nadnerczy i storszeń leczenie z tym związane
- jeśli odwodniony
- przyjmujesz leki hamujące czynność tarczycy, leki mocnoźródłające potas, a także kaptopril, enalapril lub chinidynę



PAMIĘTAJ! ZWRÓĆ SIĘ O PORADĘ LEKARZA

przed przyjęciem leku

- w przypadku wystąpienia złożowego nowotworu tarczycy lub takiego podejrzania
- w przypadku zwężenia dróg oddechowych (powodującego nudności w oddychaniu)

po przyjęciu leku

- z noworodkiem w celu skontrolowania czynności tarczycy

